



Tabelle: Zoologische Untersuchungen an der Quelle (künstliche Einleitung) im NSG Finkenberger Bruch (MG-010).

Probestelle			Zentrum	
			13791	13794
<b>Makrozoobenthon</b>				
Wissenschaftlicher Name	Deutscher Name	ÖWZ		
<b>Turbellaria</b>	<b>Strudelwürmer</b>			
<i>Dendrocoelium lacteum</i>	Milchweiße Planarie	1	-	-
<i>Polycelis nigra/tenuis</i>	ein Strudelwurm	1	-	-
<b>Gastropoda</b>	<b>Schnecken</b>			
<i>Bathymorphalus contortus</i>	Rienemtellerschnecke	-	-	-
<i>Bithynia tentaculata</i>	Gem. Schnautzenschnecke	-	-	-
<b>Bivalvia</b>	<b>Muscheln</b>			
<i>Sphaerium corneum</i>	Gemeine Kugelmuschel	-	-	-
<b>Annelida</b>	<b>Ringelwürmer</b>			
<i>Eiseniella tetraedra</i>	ein Ringelwurm	1	-	1
<i>Limnodrilus spec.</i>	ein Schlammwurm	0,5	2	2
<i>Lumbriculus variegatus</i>	Glanz-wurm	1	1	1
<i>Tubifex spec.</i>	ein Schlammröhrenwurm	0,5	-	-
<b>Hirudinea</b>	<b>Egel</b>			
<i>Glossiphonia complanata</i>	Großer Schneckenegel	1	-	-
<i>Erpobdella octoculata</i>	Rollegel	0,5	-	-
<b>Crustacea</b>	<b>Krebstiere</b>			
<i>Asellus aquaticus</i>	Wasserassel	0,5	2	3
<i>Gammarus roeseli</i>	Flußflohkrebs	-	1	2
<b>Trichoptera</b>	<b>Köcherfliegen</b>			
Limnephilidae	Köcherfliegen	-	-	-
<b>Diptera</b>	<b>Zweiflügler</b>			
Ceratopogonidae	Gnitze	-	1	2



Chironomidae	Zuckmücken	-	2	2
Chironomidae Orthoclaniinae	Zuckmücken	-	1	1
Limoniidae	Stelmücken	-	1	-
<i>Tipula spec.</i>	eine Schnake	2	-	1
<b>Anzahl</b>			<b>8</b>	<b>9</b>

Häufigkeitsstufen:

1 = vereinzelt (präsent), 2 = wenig, 3 = wenig - mittel (abundant), 4 = mittel, 5 = mittel - viel (aspektbildend), 6 = viel, 7 = massenhaft (dominant)

Häufigkeitsangaben der Wassermilben als Individuen: Männchen/Weibchen/Nymphen

Erläuterungen zur ökologischen Wertzahl (ÖWZ) nach (Fischer 1996).

ÖWZ	Definition	Biozönose	Typ
16	Vorkommen exklusiv in Quellen oder Grundwasserbewohner	aquatile Quellfauna, Fauna hygropetrica, Stygobionten	krenobiont
8	Verbreitungsschwerpunkt Quellbach oder quellnah und in Nachbarbiotope einstreudend	rheophile Quellbachfauna und akzessorische Elemente	krenophil
4	Verbreitungsschwerpunkt Rhithral regelmäßig im Krenal	Bachfauna	krenophil-rhithrobiont
2	Verbreitungsschwerpunkt Rhithral, nur selten im Krenal oder feuchtigkeitsliebende Begleitfauna oder Substratspezialisten	Bachfauna, akzessorische Landfauna	rhithrobiont terrestrisch hygrophil
1	weite Verbreitung in allen Gewässertypen	Ubiquisen	eurytop
0,5	Verschmutzungsanzeiger	Abwasserbiozönose	saprophil

## Literatur:

Fischer, Jochen (1996): Bewertungsverfahren zur Quellfauna.- Crunoecia 5: 227-240.

